



Povinná očkování

v roce 2023

Věk dítěte	Nemoci	Vakcína
2 - 3 měsíce (od započatého 9. týdne)	záškrť, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae b	Hexavakcína: Infanrix Hexa, Hexacima
4 měsíce (cca 2 měsíce po 1. dávce)		2. dávka hexa
11 - 13 měsíců (cca 6 měsíců po 2. dávce)		3. dávka hexa
13 - 18 měsíců	spalničky, zarděnky, příušnice	M-M-RVAXPRO 1. dávka
mezi 5. a 6. narozeninami	spalničky, zarděnky, příušnice	M-M-RVAXPRO 2. dávka
mezi 5. a 6. narozeninami	záškrť, tetanus, černý kašel	Tdap vakcína: Infanrix, Boostrix
mezi 10. a 11. narozeninami	záškrť, tetanus, černý kašel, dětská obrna	Tdap-IPV vakcína: Boostrix polio, Adacel Polio

HEXAVAKCÍNA

Záškrt

Tetanus

Černý kašel

Virus dětské obrny

Virová žloutenka B

Haemophilus typ B

O co jde?

- neživá vakcína
- 1 vakcína chrání proti 6 nemocem
- 3 dávky
- očkování do svalu (na stehně)

Nežádoucí účinky:

(objeví se během hodin)

- lokální – otok, bolest, zarudnutí
- celkové – horečka, únava, změna spánku, podráždění

MMR

Spalničky
Zarděnky
Příušnice

O co jde?

- živá, oslabená vakcína
- 1 vakcína chrání proti 3 nemocem
- 2 dávky
- očkování do podkoží (předloktí)

Nežádoucí účinky:

(objeví se za 5 - 14 dní)

- lokální – otok, zarudnutí
- celkové – horečka, únava, vyrážka

Naše tipy

... aby se dítě
očkování co nejméně obávalo

- Pořídte knihy s lékařskou tematikou pro děti.



- Hrajte si doma na paní doktorku (pořídte lékařský kufřík, ošetřujte hračky, příbuzné, ...).



- Vysvětlete dítěti, co se bude v ordinaci dít.
Netajte, že ho to bude bolet.



- S většími dětmi se můžete domluvit na nějaké odměně.



**Pro více informací
si poslechněte
naše podcasty!**

**29. díl - Očkování III.
hexavakcína**

**32. díl – Očkování IV.
MMR**

+

**14. díl - Očkování I.
17. díl - Očkování II.**

