



Nepovinná očkování - nehrazená zdravotní pojišťovnou (ZP)

Aktuální 12/2023

Věk dítěte (od kdy je možné podat)	Nemoci	Vakcína
6 týdnů	Rotaviry	Rotarix, Rotateq (2-3 dávky)
9 měsíců	Plané neštovice	Varilrix (2 dávky)
1 rok	Žloutenka typ A	Havrix, Vaqta (2 dávky)
1 rok (běžně 3-5 let)	Klíšťová meningoencefalitida	FSME IMMUN, Encepur
<i>dle vakcíny</i>	Chřipka Covid 19	

ROTAVIRY

Rotarix

2 dávky

Rotateq

3 dávky

O co jde?

- živá vakcína
- proti průjmovitým onemocněním způsobených rotaviry
- očkování do pusinky
- možno podávat od 6 do 12 týdnů, rozestup mezi dávkami min. 4 týdny

Nežádoucí účinky:

- průjem, zvracení
- horečka, podrážděnost
- vyrážka

PLANÉ NEŠTOVICE

Varilrix

Varivax

O co jde?

- živá vakcína
- proti planým neštovicím a ZÁROVEŇ chrání proti *pásovému oparu*
- 2 dávky, rozestup min. 6 týdnů
- očkování podkožně / do svalu
- lze podávat od 9 měsíců, běžně ale od 12 měsíců
- může se podat do 3 dnů od kontaktu s neštovicemi

Nežádoucí účinky:

- lokální – otok, bolest, zarudnutí
- celkové – horečka, únava, vyrážka (kopřivka)

ŽLOUTENKA A

Havrix 720

od 1 do 15 let

Havrix 1440

od 16 let

Vaqta

od 18 let

O co jde?

- neživá vakcína
- 2 dávky, rozestup 6-12 měsíců
- očkování do svalu
- očkovat lze od 1 roku
- očkování probíhá také při epidemii

Nežádoucí účinky:

- lokální – bolest, zarudnutí
- celkové – únava, podrážděnost, bolest hlavy

KLÍŠŤOVÁ MENINGOENCEFALITIDA

FSME-IMMUN 0,25

od 1 do 15 let

FSME-IMMUN 0,5

od 16 let

Encepur pro děti

od 1 do 11 let

Encepur

od 12 let

O co jde?

- neživá vakcína
- od 1 roku, běžně se podává u předškolních/školních dětí
- očkování do svalu
- v prvním roce 3 dávky (2. za 1-3 měsíce; 3. za 5-12 měsíců)
- 4. dávka za 3 roky
- přeočkování dále každých 5 let

Nežádoucí účinky:

(objeví se během hodin)

- lokální – bolest, zarudnutí
- celkové – únava, bolest hlavy, zvracení, bolesti svalů

CHŘIPKA

Vaxigrip tetra

Od 6 měsíců

Influvac tetra

Od 6 měsíců

obě injekčně do svalu

Fluenz tetra

Od 2 do 17 let

podání do nosu
(nasální)

O co jde?

- neživá vakcína
- proti chřipce A a B
- očkování v sezóně (podzim)
- při zahájení do 9 let - v prvním roce 2 dávky, následující roky 1 dávka
- od 9 let jedna dávka ročně
- do svalu / od 2 let nasálně
- pro každou sezonu vakcína nově upravena

Nežádoucí účinky:

(objeví se během hodin)

- lokální – bolest, zarudnutí
- celkové – únava, podrážděnost, horečka, malátnost, bolest svalů

**Pro více informací
si poslechněte
naše podcasty!**

**Prohlédněte si příspěvky
věnované povinným a
nepovinným hrazeným
očkováním, kde
naleznete i naše tipy pro
úspěšné očkování!**

11. díl - Klíště

31. díl - Průjem

34. díl - Neštovice

+

**14. díl - Očkování I.
17. díl - Očkování II.**