

Očkovací kalendář - jak na to prakticky

Dětský očkovací kalendář hrazeného očkování v ČR platný od 1. 1. 2022



Termín Věk dítěte	Povinná hrazená očkování		Nepovinná hrazená očkování	
	Nemoc	Očkovací látka	Nemoc	Očkovací látka
od 4. dne do 6. týdne	Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) *	BCG vaccine SSI		
od započatého 9. týdne (2 měsíce)	Záškrt, tetanus, čemý kašel, dětská obrna, virová onemocnění vyvolaná Haemophilus			
2.–3. měsíc				Bexsero – 1. dávka**
				Prevenar 13, Synflorix – 1. dávka ***
4 měsíce	Záškrt, tetanus, čemý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B,	Hexavakcína: Infanrix Hexa, Hexacima 2. dávka*		
4.–6. měsíc				2. dávka
				13, Synflorix – 2. dávka ***
11.–13. měsíc	Záškrt, tetanus, čemý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae b	Hexavakcína: Infanrix Hexa, Hexacima 3. dávka*		
12.–15. měsíc				Bexsero – 3. dávka
				IMO A,C,W,Y Nimenrix, Menquadri – 1. dávka****
				IPO Prevenar 13, Synflorix – 3. dávka ***
13.–18. měsíc	Spalničky, zarděnky, příušnice			
od dovršení 5. do dovršení 6. roku věku dítěte	Spalničky, zarděnky, příušnice			
	Záškrt, tetanus, čemý kašel	Tdap vakcína: Infanrix, Boostrix (Infanrixhexa)		
od dovršení 10. do dovršení 11. roku	Záškrt, tetanus, čemý kašel, dětská obrna			
od dovršení 13. do dovršení 14. roku			Onemocnění lidským papilomavirem	Cervarix, Gardasil, Gardasil 9 (celkem 2 dávky)
od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku			IMO B	Trumenba, Bexsero (celkem 2 dávky) =
			IMO A,C,W,Y	Nimenrix, Mervac, Menquadri 1 dávka = =

Včetně tuberkulinného testu prováděného v případech, kdy je třeba očkovat dítě starší 6 týdnů; očkování se v takovém případě provádí jen tehdy, je-li tuberkulinný test negativní.
 * Vše platí pro rizikové skupiny dětí.
 * U nedonošených dětí se očkování provádí třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou nejméně 6 měsíců po poslední dávce (tedy schéma 3+1).
 ** Proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení druhého měsíce věku.
 *** U nedonošených dětí se očkování provádí třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou nejméně 6 měsíců po poslední dávce (tedy schéma 3+1).
 **** Proti invazivním meningokokovým infekcím skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou od dovršení prvního do dovršení druhého roku věku.
 = Proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, je-li očkování provedeno jednou dávkou od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku. Očkování je hrazeno, pokud bylo v tomto věku zahájeno.
 = Proti invazivním meningokokovým infekcím skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku.

BBO Invazivní meningokové onemocnění
 IPO Invazivní pneumokokové onemocnění

Upravováno podle vyhl. č. 137/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Příklady **očkovacího kalendáře** z praxe

- V ordinacích se setkáváme s mnoha různými scénáři očkování.
- Většinou se zahájí očkování v domluveném termínu, ale často se musí odkládat (např. kvůli horečkám).
- Každý rodič má k očkování jiný přístup a lékař by se měl rodiči snažit vše co nejlépe vysvětlit a společně by měli najít shodu.
- Na následujících obrázcích naleznete 4 modelové situace očkování v našich ordinacích. První tři jsou ty nejčastější, poslední přidáváme pro úplnost.

Pro úplné informace o očkování si poslechněte naše podcasty, kde se jim věnujeme. Ve 14. a 17. díle naleznete základní informace a v 29., 32. a 50. díle informace o jednotlivých očkování.

Možnost A) „podám vše + co nejdříve“

- V 6 týdnech - 1. **rotaviry**
- Ve 3 měsících - 2. rotaviry
- 1. **hexavakcína**
- 1. **pneumokoky**
- Ve 4 měsících - 1. **meningokok B**
- V 5 měsících - 2. hexavakcína
- 2. pneumokok
- V 6 měsících - 2. meningokok B
- V 11 měsících - 3. hexavakcína
- 3. pneumokok
- V 1 roce - 3. meningokok B
- Ve 13 měsících - **meningokok ACWY**
- Ve 14 měsících - **MMR** vakcína
- +

V 6 měsících mám dítě chráněné proti všem nemocem, které by ho mohly ohrozit a je proti nim očkované.

Mám dostatek prostoru pro odklad očkování z důvodu akutního/akutních onemocnění.

Ve 14 měsících mám dítě očkované všemi dostupnými vakcínami – mám ho chráněné jak nejlépe mohu.

- Od 6 měsíců očkuji proti **chřipce** a proti **COVID-19**.
- Před nástupem do kolektivu podám očkování proti **neštovicím a žloutence typ A**.
- Cca od 4 let zahajuji očkování proti **klíšťové meningoencefalitidě**.
- V 11-13 letech očkuji proti **HPV**.
- Ve 14-16 letech přeočkuji proti **meningokoku B i ACWY**.

Možnost B) „podám, co mi doporučíte, ale bojím se“

- Ve 3 měsících - 1. **hexavakcína**
 - Ve 4 měsících - 1. **pneumokoky**
 - V 5 měsících - 2. hexavakcína
 - V 6 měsících - 2. pneumokok
 - V 8 měsících - 1. **meningokok B**
 - V 10 měsících - 2. meningokok B
 - V 1 roce - 3. hexavakcína
- 3. pneumokok
 - Ve 13 měsících - **meningokok C**
 - Ve 14 měsících - **MMR** vakcína
 - V 18 měsících - 3. meningokok B
- +

Vynechám rotaviry (za předpokladu, že nemám sourozence ve školce).

Zpočátku očkuji rozloženě, Mám dítě chráněné v 10 měsících.

V 18 měsících mám dítě očkované vším kromě rotavirů.

- Očkování proti **chřipce** ve 2 letech nasální vakcínou, očkování proti **covid19** dle situace.
- Před nástupem do kolektivu podám očkování proti **neštovicím a žloutence typ A**.
- Od 4-7 let zahajuji očkování proti **klíšťové meningoencefalitidě**.
- V 11-13 letech očkuji proti **HPV**.
- Ve 14-16 letech přeočkuji proti **meningokoku B i ACWY**.

Možnost C) „podám jen povinná očkování“

- Ve 3 měsících - 1. **hexavakcína**
- V 5 měsících - 2. hexavakcína
- V 11 měsících - 3. hexavakcína

- Ve 13 měsících - **MMR** vakcína

Začnu očkovat včas a stihnu do roka naočkovat hexavakcínu, i když budu pro nemoc někdy odkládat.

Na MMR mám čas od 13 do 18 měsíců.

Možnost D) „nepodám NIC“

- Nejméně častá situace (většina rodičů alespoň povinná očkování podá).
- Rodič by měl být informován o rizicích jednotlivých nemocí.
- Vždy na návštěvě lékaře (např. LSPP) **JE VHODNÉ hlásit**, že není dítě očkováno.